Q

hernie avec gangrené

par m. monbalon

Monsieur

Les Savantes dissertations sur les hernies insserrées dans les memoires de l'académie Royale de chirurgie paroissent ne rien laisser a desirer sur cette partie de l'art, tant par le detail de tout ce qui caracterise les diferends état de cette maladie que par les rares faits de pratique qu'on y voit.

J'ay fait plusieurs fois l'operation du Bobonnocelle, mais non jamais avec autant d'habiletté qu'aprés avoir veu dans le quatrieme volume de cet ouvrage vos belles reflexions sur cette operation et profitté de trois préceptes essentiels que j'y ay trouvé. j'ay éprouvé avec bien de la satisfaction sur un jeunne homme que j'operay l'esté dernier, le septieme jour d'un étranglement inguinal accompagné des simptomes les plus alarmants, que, la situation du sujet selon la methode de feu monsieur votre pere, l'incision des teguments portée du premier coup au dessus de l'anneau et l'ouverture du sac herniaire sans les precautions innutilles recomandées par nos meilleurs auteurs, rendent l'operation plus simple, l'operateur moins embarrassé et le malade plustot delivré de ses mains. mon jeunne homme fut gueri vingt cinq jours aprés l'operation, malgré que l'epiploon qui descendoit jusques dans les Bources fut en partie gangrené et l'intestin engagé dans l'anneau d'environ deux travers de doigt un peu livide.

~~Cependant Monsieur, malgré que cette~~ , quoyque la matiere ~~trait~~ des hernies paroit traitée à fonds par tout ce que j'ay leu dans les bons livres voicy un cas ~~de cette espece~~ qui m'a pareu nouveau par sa marche extraordinnaire.

Monsieur Bolhaberiague chanoine du chapitre du St. Esprit

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

ARC 14 d 31 n°1

prés Bayonne, agé denviron Soisante dix ans, ayant joui
jusques la d'une assés bonne Santé et d'un bon apetit; Se
trouva, dans le mois de decembre dernier, incomodé de Son
Estomac aprés chaque repas; C'etoit un poids, un malaise
et des douleurs; point de vomissement ni nauzées; la digestion
faite il Se trouvoit a Son aise, mangeoit il de nouveau,
les memes incomodités revennoit au point qu'il etoit
obligé de Se priver de manger pour ne point Soufrir.
n'ayant point été gueri ni Soulagé par quelque purgation
quil prit, quoy qu'elle eut bien operé, il Consulta Son
medecin lequel atribuant Cela a la foiblesse ou debilité
de l'Estomac lui Conseilla l'usage des eaux de Cauteres,
et quelques autres Estomachiques egalement tonniques
Sans Succés. il passa plus d'un mois dans Cet etat, vacant
néanmoins a Ces petites afaires et promenant dans le dehors;
mais le defaut de Sufisante quantité de nourriture Solide et
les Soufrances l'ayant afoibli, il fut obligé de garder la Chambre.
il y avoit environ un mois et demy du Commencement du
derrangement de Son Estomac, lors quil Sentit une trés legere
douleur a l'aine droite; ayant eté apellé pour Cela, je trouvay
une petite tumeur sur l'anneau de la grosseur d'un petit
oeuf, trés dure et un peu innegalle; pençeant que Ce
pouvoit etre L'Epiploon qui S'etoit engagé dans le
passage; je tantay, mais, innutilement de le faire rentrer.
n'ayant peu reussir, je m'occupay des moyens de ramolir
Ce petit corps, Sur la nature duquel, je n'avois que des
doutes. Sa Situation et Son peu de mobilitté, m'anonceoit
bien quelque Chose qui avoit passé par L'anneau, ~~mais~~
je penceay meme que le disordre de l'estomac pouvoit
dependre dela, quoy que la tumeur n'eut ~~etée~~ aperceüe que de
Ce moment; mais tout Cela ne presentoit que des ~~doutes~~, et ~~…~~
l'absence des autres Simptomes de l'Etranglement et de
L'Engouement insiparables, Ce me Semble, d'une hernie ressente
me fesoit presumer aussi une tumeur humoralle.
Les Cataplasmes des herbes Emolientes et Ceux de micapanis

continuées huit ou neuf jours, ramolirent mais augmenterent
considerablement le volume de la tumeur, et vers le douzieme
jour de leur aplication, il y eut fluctuation; je ne me pressay
point d'ouvrir ce depot ayant a faire a un sujet foible et
pusillanime; il souvrit deux jours aprés, je dilatay, cette
petite ouverture, sufisament pour donner issue a une
assés abondante quantité de matiere fœtide qui entraina
des petits scarres, il en sortit pendant trois jours, le quatrieme
la supuration parut assés louable et la devint de plus en
plus jusqu'au huitieme jour de louverture. je trouvay ce jour
la, l'apareil innondé de serosités, et layant levé, je vis
sortir abondament par la playe, avec un petit bruit, de
ces serosités ecumeuses et noiratres. La maladie parut
alors dans tout son jour; je ne doutay plus que les scarres
qu'avoit entrainé le pus ne fussent des lambeaux de
L'Epiploon, dans lequel l'intestin s'étant trouvé ~~un~~ peu
pincé par une petite portion de sa parroy, a deu aussi
participer, par cet endroit, a la pourriture, mais sa chutte
n'ayant pas été aussi prompte que celle de L'Epiploon, l'intestin
n'a eté ouvert que quelques jours aprés. Ces serosités, qui
dabord etoit noiratres devinrent ensuitte billieuse et plus
epaisses et enfin des excrements plus liés sont sortis et continuent
de sortir encore depuis environ trois semaines; ils sortent
neanmoins aussi par l'anus, ce qui me fait esperer qu'ils
cesseront bientot de couler par la playe.

Voila Monsieur une hernie terminée par gangrene
meconnue, quoyque soubçonnée, jusqu'au huitieme jour
aprés son ouverture exterieure, c'est adire jusqu'a l'ouverture
de l'intestin ~~et~~ a l'issue des excrements. par la. nul
autre signe certain de son existance n'a paru, le malade
lui meme ne s'est jamais creu ateint de cette maladie, ce
qui devoit faire suposer que la hernie, s'il y en avoit, etoit
resoute, et une telle hernie avec etranglement est
toujours acompagnée de douleur, tension, nausées,
vomissement, miserere &c. si non de tous ces simptomes
du moins d'une bonne partie. la legere douleur qui
donna lieu icy a la decouverte de la tumeur, n'a jamais

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

eté que locatte, quoy que bien forte pendant son augmentation
les parties, contenues dans l'abdomen n'ont point paru
participer a ce desordre exterieur.
Enfin Monsieur les excrements qui pour l'ordinnaire
innondent le tissu cellulaire, avant l'ouverture des teguments
et qui sortent les premiers lorsqu'ils sont ouverts, dans les
hernies terminées par gangrenne, ne paroissent, icy,
que huit jours aprés, et lors qu'on a lieu de croire,
par l'aspect d'une supuration louable, qu'on n'a plus
a traiter qu'une playe simple.
J'ose me flater Monsieur que vous me ferés la grace
de m'acorder deux mots de votre façon de penser sur
l'exposé que je prenos la liberté de vous adresser, et
me permetrés d'y revenir lorque quelque cas particulier
m'en fournira l'ocasion.
J'ay l'honneur d'etre avec un profond respect

Monsieur

Votre trés humble
et trés obeissant serviteur
Monbalon Chirurg.n
major de la marinne et
de l'hopital de la ville
a Bayonne

ce 31 mars 1771